

Sortie du 26 mars 2022

A partir des Chevrières en direction du bois au sud en limite des communes de Charbonnières et Saint Martin Belle Roche

Il faisait très beau. Étaient présentes Chystèle, Jacqueline Janine et Mireille.

Au début sur les chemin est présenté la flore habituelle:

- [Veronica persica](#), la Véronique de Perse, une plantaginacée
- [Lamium hybridum](#), le lamier hybride, une lamiacée
- [Erodium cicutarium](#) ou bec- de-grue
- [Géranium pyrenaicum](#) ou géranium des Pyrénées une autre geraniacée à la fleur un peu mauve
- [Glechoma hederacea](#) ou lierre terrestre en abondance une lamiacée
- [Potentilla neumanniana](#) ou potentille de Neumann, une rosacée très courante sur ces terres calcaires
- [Primula veris](#), le coucou, une primulacée très courante
- [Muscari neglectum](#) (éventuellement [botryoides](#)) le muscari négligé, une asparagacée
- [Ranunculus bulbosus](#), la renoncule bulbeuse ou bouton d'or, une ranunculacée
- [Helleborus foetidus](#), l'ellébore fétide encore une ranunculacée
- Plus étonnant un exemplaire unique de [Himantoglossum robertanum](#) autrefois dénommée Barlia, l'orchis de Robert le cousin de l'orchis bouc une méditerranéenne très précoce que l'on peut voir dès janvier dans le Midi et qui remonte au nord en suivant l'axe du Rhône avec le réchauffement.



Après un talus avec :

- [Alliaria petiolata](#), l' alliaire, une brassicassée
- [Brassica napus](#), probable un colza, une autre brassicacée
- [Hieracium maculatum](#), une épervière aux feuilles avec des tâches rouge sombre, une astéracée

On arrive à un chemin de vigne avec :

- [Crépis sancta](#) ou crepide de Nîmes, cette asteracée du sud envahissante dans les vignes
- [Capsella bursa-pastoris](#), la bourse-à-pasteur, une autre brassicassée courante.
- [Stellaria media](#), le mouron des oiseaux, une caryophyllacée
- [Euphorbia cyparissias](#) ou l'euphorbe petit-cyprès en début de floraison
- [Vicia sativa](#), la vesce cultivée, une fabacée

Et sur le talus étonnamment dans ce milieu sec

- [Equisetum arvense](#) avec uniquement les rameaux fertiles



On rentre ensuite dans la partie plus boisée où on revoit

- [Anémone nemorosa](#), l'anémie Sylvie ou anémone des bois
- [Daphne laureola](#) ou laurier des bois
- [Stellaria holostea](#), la stellaire holostée très présente, en début de floraison, une caryophyllacée
- [Potentilla sterilis](#) ou potentille faux-fraisier, une rosacée
- [Euphorbia amygdaloides](#) ou euphorbe des bois
- [Ruscus aculeatus](#), le fragon avec ses fruits rouge vif collés aux [cladodes](#)
- [Mercuriale perennis](#), un euphorbiacée disque dont on verra des pieds mâles et femelles

- [Polygonatum odoratum](#), le sceau de Salomon en tout début de floraison, une asparagacée
- [Scilla bifolia](#), la scille à deux feuilles est fanée et difficile à repérer

Enfin nous arrivons sur le site relativement restreint de :

- [Corydalis solidia](#) ou corydale solide, curieusement classée dans les papaveracées. Elle a fructifié très vite depuis notre précédent repérage du 19. Nous l'observons entière.



A noter que sur ce même site restreint on va pouvoir observer dans 10-15 jours des [Buglossoides purpureocaerulea](#) ou greuil pourpre-bleu